

Choroby

1. Salmonelloza [Paratyfus gołębi]

Jest to najgroźniejszą bakteryjną chorobą gołębi. Choroba ta jest przyczyną poważnych strat w stadach gołębi, a w gołębniku może utrzymywać się latami. Brak higieny, zalegający kał, wilgoć w gołębnikach to czynniki przedłużające żywotność zarazków.

Salmonella może dostać się do organizmu poprzez

- * zanieczyszczoną karmę, wodę
- * wdychanie kurzu zawierającego zarazki
- * podczas karmienia młodych

Bakteria salmonelli bardzo łatwo przenika do organizmu ptaka. Ryzyko zakażenia zwiększa sprowadzenie do gołębnika nieznanych nam gołębi oraz styczność z dzikim ptactwem.

Objawem wystąpienia choroby jest masowa śmiertelność młodych, najczęściej w okresie kiedy zaczynają okrywać się piórami.

ROZRÓŻNIA SIĘ NASTĘPUJĄCE POSTACIE KLINICZNE

Nadostra- jest przyczyną nagłych padnięć ptaków bez typowych objawów

Jelitowa- występuje typowa biegunka, kałomocz jest wodnisty, trawiasto zielono-brązowy, wskutek biegunki podłoga gołębnika jest jakby zlaną wodą w kale występuje nie strawiony

Ptaki bardzo szybko chudną, przestają się rozmnażać.

Stawowa- chory staw jest obrzękły, gorący, wypełniony płynem w ciągu kilku dni tworzy się charakterystyczny guz. Ptak opuszcza skrzydła.

Nerwowa- przebiega z zapaleniem mózgu, występuje skręty szyi porażenie kończyn i skrzydeł, utrata równowagi, paraliż.

Po zaleczeniu choroba przycicha, ale przy osłabieniu organizmu np. [po sezonie podczas pierzenia] .gdy ptak jest osłabiony występuje na nowo. Należy pamiętać że wyleczone ptaki mogą być nosicielem choroby. Nie wykazując objawów gołąb nosiciel wydalać bakterie powoduje stałe utrzymywanie się zarazków w środowisku.

Należy chronić ptaki przed nadmiernym osłabieniem, sprawdzać nowo nabyte ptaki, przeprowadzać kuracje profilaktyczne, badać kał gołębi, przeprowadzać gruntowną dezynfekcję gołębników jeżeli to możliwe i nie stanowi zagrożenia pożarowego stosować opalanie pomieszczeń hodowlanych. Obowiązkowo co roku szczepienie młodych i dorosłych ptaków.

Szczepionka np. Salmovir , Zoosal – T szczepionka tylko na salmonellozę
Leki ; Baytril, Parastop, Laudin, Linco-spectin 100 jest to bardzo skuteczny lek

Leki dawkować według wskazań producenta lub zaleceń weterynarza

2. Mykoplazmoza

Jest to choroba bakteryjna wywoływana przez drobnoustroje mycoplasma. Czynnikiem występującej tej choroby jest stres długotrwałe loty, transport, przegrzanie, Choroba zaczyna się od kichania ptaków i mokrego wycieku z otworów nosowych podczas trwania choroby wyciek gęstnieje i zatyka otwory nosowe, pojawia się duszność. Jednocześnie występuje zapalenie spojówek, światłowstręt. Podczas choroby występują zmiany w tchawicy, oskrzelach i workach powietrznych. Po odpowiednim leczeniu powrót ptaków do zdrowia jest szybki.

Szczepionka; Mycosalmowir

Leki; Orni specjal, Ornithoze 3, Myxoornith, Tetraxil, Ornisol

Leki dawkować według wskazań producenta lub zaleceń weterynarza

3. Paramyxowiroza

Jest to choroba zakaźna. Rozprzestrzenia się w stadzie z gołębia na gołębia podczas kontaktu ptaków, oraz poprzez brudny pokarm i wodę. Chorują ptaki młode jak i kilkuletnie. W typowych przypadkach u ptaków występuje płochliwość, zwiększony pobór wody, zmniejszone łaknienie, pogorszenie jakości kałomoczu, kał jest mocno rozrzedzony. Jednocześnie z objawami pojawiają się zaburzenia układu nerwowego. Mają one łagodne jak i mocne nasilenie skrętów głowy, nieskoordynowane ruchy uniemożliwiające ptakowi pobór pokarmu oraz wody. Zaburzenia nerwowe łagodzą duże dawki witaminy z grupy B, C, E. Leczenie ptaki z zaawansowanym stadium choroby jest ciężko wyleczyć. Chore ptaki należy niezwłocznie odizolować. Jeżeli nie są to wartościowe dla hodowcy ptaki należy je usunąć. Ptaki wyglądające na zdrowe należy zaszczepić.

Szczepionka; PM-VAC, NOBIVAC – PARAMYXO

4. Ospa

Jest to choroba wirusowa gołębi wywoływana przez zarazki Avipoxvirus. Choroba ta jest szczególnie niebezpieczna dla ptaków młodych. Atakuje najczęściej z końcem pory letniej. Ospa przebiega z tworzeniem się charakterystycznych wykwitów, zwanych krostami ospowymi. Występują one najczęściej w okolicy dzioba, otworów nosowych, steku,

powiek, nogach. Przy postaci defteroidalnej dochodzi do tworzenia się wykwitów w jamie dziobowej ptaka ta postać kończy się najczęściej śmiercią, Ponieważ narośle zatykają przełyk, tchawice co utrudnia ptakowi pobór pokarmu, wody oraz oddychanie. Gołąb może zarazić się ospą przez najdrobniejsze zranienie przez które do organizmu ptaka może wniknąć kurz z zarazkami. Obowiązkowe jest szczepienie młodych przed sezonem lotowym. Chore ptaki niezwłocznie odizolować. W leczeniu stosuje się antybiotyki o szerokim spektrum działania. Leczenie wspomagające witamina C, A, D3, E. Krosty należy smarować roztworem jodu, gliceryną.

Szczepionka; POXVAC-K, PIGEON POXVACCINAE
Leki; AMOXICYLINA, DOXYCYLINA, TETRACYKLINY

Leki dawkować według wskazań producenta lub zaleceń weterynarza

5. Katar zakaźny

Jest to choroba atakująca układ oddechowy gołębi. Wywołuje ją wirus z grupy Herpes. Zarazki wywołujące katar to chlamydia, mykoplazmy, herpesvirus. Chorobą tą zakazić mogą się ptaki w każdym wieku, u gołębi młodych przebiega znacznie ciężiej. Ptaki zarazić się mogą drogą kropelkową poprzez karmę, wodę, kał. Chore gołębie kichają, otwory nosowe mają brudne i zaklejone, narosty na dziobie ptaka stają się szare. W dziobie, gardle i na podniebieniu widać ciągnące się nitki śluzu. W dalszym stadium choroby obserwujemy utrudnione oddychanie z otwartym dziobem i rzęzenie ponieważ nagromadzony śluz utrudnia ptakowi oddychanie. Chore ptaki słabną, chudną tracą apetyt oraz formę. Ciężkie długotrwałe loty sprzyjają wystąpieniu tej choroby. Ważnym czynnikiem w naszym gołębniku jest prawidłowo działająca wentylacja pozbawiona przeciągów.

Leki; Orni specjal, Ornithoze 3, Ornisol, Myxoornith, Tetraxil, Coryzamix, OrniCure

Leki dawkować według wskazań producenta lub zaleceń weterynarza

6. Ornitoza [chlamydioza]

Jest to choroba wywoływana przez drobnoustroje z rodzaju Chlamydia. Jest to choroba odzwierzęca może przenosić się na człowieka. Najbardziej podatnymi na tą chorobę są młode ptaki. Do organizmu może dostać się poprzez zakażony pokarm, wodę, wzajemne dziobanie się gołębi, karmienie młodych.

Postać ostra objawia się spojówki są obrzękłe, powieki sklezione, wrażliwość na światło, spadek witalności, duże straty w lotach ptaki momentalnie tracą formę. Choroba może przetrzeć się na górne drogi oddechowe ptaka, gołąb dostaje kataru o śluzowatej konsystencji. Obserwujemy częste kichanie, drapanie się po dziobie podobnie jak w

katarze zakaźnym. W przewlekłym stanie choroby słyszymy "rzężenie". Bardzo ważna jest prawidłowa wentylacja w gołębniku pozbawiona przeciągów.

Leki; Orni specjal, Ornitoze 3, Ornisol, Doxycyline, Tylosine, Myxoornith, Tetraxil

Leki dawkować według wskazań producenta lub zaleceń weterynarza

7. Adenowiroza [Adenocoli]

Choroba ta jest co roku zmorą prawie każdego hodowcy, dotyczy ona młodych ptaków do dziewiątego miesiąca życia. Choroba przenoszona jest do gołębnika poprzez powracające z lotów ptaki najczęściej infekcja ta przenoszona jest w koszach transportowych w których przebywają nasze ptaki. Objawia się ona utratą apetytu, wymioty, umieralność, wodniste zielono-żółte odchody, specyficzny zapach. Gołębie tracą chęć do latania i treningów, przesiadują z nastroszonymi piórami. Objawy te są poważnym skutkiem uszkodzeń jelit wywołanych przez wirus adeno. Uszkodzone narządy są wówczas podatne na atak E-coli. Choroba jest ciężka do wyleczenia ponieważ nie dysponujemy odpowiednimi, jak i wyłącznymi lekami na tę chorobę, ani szczepionką. Niezwłoczne podanie leku zwalczającego bakterie E-coli osłabi objawy choroby.

Leki; 4w1, Adeno plus, Adenosan, Belgamco

Leki dawkować według wskazań producenta lub zaleceń weterynarza

8. Kokcydioza

Jest choroba wywoływana przez pierwotniaki z rodziny Eimeria. Pasożyt jest odporny na środki odkażające, oraz na czynniki środowiska zewnętrznego. Każdy gołąb jest nosicielem tej choroby i wydalą oocyty. Choroba jest niebezpieczna u młodych ptaków. Chore na kokcydiozę gołębie chudną, mają wodnista żółto-brązową biegunkę czasami z krwią. Ustrzec się tej choroby możemy poprzez higienę w gołębniku stosowanie środków profilaktycznych przed i po lęgu ptaków.

Leki; Baycox, Sulfatyf, BS

Leki dawkować według wskazań producenta lub zaleceń weterynarza

9. Trychomonadoza [rzęśistnica, żuły guzek]

Jest najczęściej występującą w kraju chorobą pasożytniczą. Wywołuje ją pierwotniak

Trichomonas gallinae. Wrażliwy jest na wysuszenie i środki do dezynfekcji. Źródłem zakażenia są rodzice karmiący młode, stojąca w rynnach i zagłębieniach dachów woda, oraz brudne poidła. W przypadku piskląt przez pępek oraz zranioną błonę śluzową. Dlatego należy przeprowadzać kuracje przed łączeniem ptaków w pary. Objawy są następujące w jamie dziobowo-gardłowej można dostrzec żółte ogniska zapalne, małe żółte guzki, biegunka, opuszczone skrzydła, osowiałość ptaków. Przy objawie pępkowej powstaje wrzód pod skórą. Przy odmianie organowej obserwujemy zmęczenie, stroszenie piór, stwierdzić ją możemy jedynie poprzez sekcje zwłok. Przed parowaniem jak i po odsadzeniu młodych od rodziców pamiętajmy aby przeprowadzić naszym ptakom kuracje.

Leki; BS, TKK, TKV, Tricho Plus, Ronidazol 10%, Awimetronid, Spartix

Leki dawkować według wskazań producenta lub zaleceń weterynarza

[TopLista - Gołębie Pocztowe](#)